

Mogelijke uitslagen Suikerabsorptietest (SAT)

1. Normale permeabiliteit van de dunne darm
2. Verhoogde permeabiliteit van de dunne darm, waarbij gedacht kan worden aan:
Primaire oorzaken:
 - Coeliakie (*bepalingen anti-TTG/EMA gedaan?*)
 - (Status na) gastro-enteritis
 - parasitaire darminfectie (Giardia, prevalentie 2-4% in Nederland) (*feceskweek?*)
 - Bestralingsenteritis
 - Medicijngedeïnduceerd, bv NSAID's (LET OP, gebruik via zelfzorg?)
 - M. Crohn van de dunne darm (*eventueel calprotectine in feces bepalen*)
 - Maligniteit van de dunne darm (zeldzaam)
 - Ischemie van de dunne darmSecundaire oorzaken:
T.g.v. aandoeningen aan de maag, pancreas of galblaas
3. Passend bij een (primaire of secundaire) lactose-intolerantie
4. Passend bij een (primaire of secundaire) sucrose-intolerantie

NB. Bij uitslag 4. wordt vermeld dat een proefbehandeling met bi-myconase mogelijk is. Een (handgeschreven) recept is dan noodzakelijk ivm de eisen van de IGZ. Aangezien het middel niet in de taxenormen vermeld staat, is een handgeschreven recept vooralsnog dus nodig. Bijvoorbeeld 100 capsules, 3 maal daags met de maaltijd 1-2 capsules. Dit recept hoeft slechts één keer voorgeschreven te worden. Zie elders op de site voor wat betreft de bijsluiters en contactgegevens van Apotheek De Akker (apotheker N. Knoppert).